

胃がん

術後補助

CAPOX(XELOX)

主な使用目的

術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カベシタピン	C法（下記参照※2）	D1-14	経口	分2	21日間	原則8コース実施
オキサリプラチン	130 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		

S1/DTX

主な使用目的

術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
S1	下記参照※1	D1-14	経口	分2	21日間	①コースはS1のみ ②-⑦コースはDTX併用 ⑧以降はS1のみ継続 (2投1休または4投2休) 合計1年間実施
DTX	40 mg/m ²	D1	点滴静注	60分間		

進行再発

CAPOX(XELOX)

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カベシタピン	C法（下記参照※2）	D1-14	経口	分2	21日間	
オキサリプラチン	130 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		

CPT-11(A)

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
イリノテカン	100 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	90分間	28日間	

CPT-11(B)

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
イリノテカン	150 mg/m ²	D1,15	点滴静注	90分間	35日間	

DTX

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ドセタキセル	75 mg/m ²	D1	点滴静注	60分間	21日間	

G-SOX

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
S1	下記参照※1	D1-14	経口	分2	21日間	
オキサリプラチン	100 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		

胃がん

mFOLFOX6

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
レボホリナート	200 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間	14日間	CVポート レボホリナートとオキサリプラチンは同時投与 携帯型インフューザーポンプ使用
オキサリプラチン	85 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		
フルオロウラシル	400 mg/m ²	D1	点滴静注	全開投与		
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	D1	点滴静注	46時間		

nab-PTX

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アルブミン懸濁型 バクリタキセル	260 mg/m ²	D1	点滴静注	30分間	21日間	

RAM/nab-PTX

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ラムシルマブ	8 mg/kg	D1,15	点滴静注	60分間	28日間	
アルブミン懸濁型 バクリタキセル	100 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	30分間		

RAM/wPTX

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ラムシルマブ	8 mg/kg	D1,15	点滴静注	60分間	28日間	
バクリタキセル	80 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	30分間		

RAM

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ラムシルマブ	8 mg/kg	D1	点滴静注	60分間	14日間	

SP (S1/CDDP)

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
S1	下記参照※1	D1-21	経口	分2	35日間	
シスプラチン	60 mg/m ²	D8	点滴静注	120分間		

胃がん

wPTX

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
バクリタキセル	80 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	60分間	28日間	

XP

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カベシタピン	C法（下記参照※2）	D1-14	経口	分2	21日間	
シスプラチン	80 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		

ニボルマブ

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	240 mg/body	D1	点滴静注	30分間	14日間	

HER/CAPOX(XELOX)

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カベシタピン	C法（下記参照※2）	D1-14	経口	分2	21日間	HER2陽性症例
トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間		
トラスツズマブ（2回目以降）	6 mg/kg					
オキサリプラチン	130 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		

HER/SOX

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
S1	下記参照※1	D1-14	経口	分2	21日間	HER2陽性症例
トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間		
トラスツズマブ（2回目以降）	6 mg/kg					
オキサリプラチン	100 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		

HER/XP

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カベシタピン	C法（下記参照※2）	D1-14	経口	分2	21日間	HER2陽性例
トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間		
トラスツズマブ（2回目以降）	6 mg/kg					
シスプラチン	80 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		

胃がん

HER/mFOLFOX6

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ (初回)	6 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	14日間	HER2陽性症例
トラスツズマブ (2回目以降)	4 mg/kg					
レボホリナート	200 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		
オキサリプラチン	85 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		
フルオロウラシル	400 mg/m ²	D1	点滴静注	全開投与		
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	D1	点滴静注	46時間		

T-Dxd

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ デルクスステカン	6.4 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2陽性症例

ニボルマブ + CAPOX(XELOX)

主な使用目的

進行再発

2022年10月 NEW

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	360 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	HER2陰性症例
カベシタピン	C法 (下記参照※2)	D1-14	経口	分2		
オキサリプラチン	130 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		

ニボルマブ + mFOLFOX6

主な使用目的

進行再発

2022年10月 NEW

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	240 mg/body	D1	点滴静注	30分間	14日間	HER2陰性症例
レボホリナート	200 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		
オキサリプラチン	85 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		
フルオロウラシル	400 mg/m ²	D1	点滴静注	全開投与		
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	D1	点滴静注	46時間		

ニボルマブ + SOX

主な使用目的

進行再発

2022年10月 NEW

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	360 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	HER2陰性症例
S1	下記参照※1	D1-14	経口	分2		
オキサリプラチン	130 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		

※1 S1用量

胃がん

体表面積	1日投与量
1.25㎡未満	80mg
1.25㎡～1.5㎡未満	100mg
1.5㎡以上	120mg

※2 カベシタピン用量(A法)

体表面積	1日投与量
1.31㎡未満	1800mg
1.31㎡～1.64㎡未満	2400mg
1.64㎡以上	3000mg

※2 カベシタピン用量(B法)

体表面積	1日投与量
1.33㎡未満	3000mg
1.33㎡～1.57㎡未満	3600mg
1.57㎡～1.81㎡未満	4200mg
1.81㎡以上	4800mg

※2 カベシタピン用量(C法)

体表面積	1日投与量
1.36㎡未満	2400mg
1.36㎡～1.66㎡未満	3000mg
1.66㎡～1.96㎡未満	3600mg
1.96㎡以上	4200mg

※2 カベシタピン用量(D法)

体表面積	1日投与量
1.31㎡未満	1800mg
1.31㎡～1.64㎡未満	2400mg
1.64㎡以上	3000mg