

# 尿路上皮がん

## GC (GEM/CBDCA)

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m <sup>2</sup>	D1.8	点滴静注	30分間	21日間	
カルボプラチン	AUC 4	D1	点滴静注	180分間		

## GEM

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m <sup>2</sup>	D1.8.15	点滴静注	30分間	28日間	

## GP (GEM/CDDP)

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m <sup>2</sup>	D1.8.15	点滴静注	30分間	28日間	
シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>	D2	点滴静注	180分間		

## Low-Dose CDDP (CRT)

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
シスプラチン	20 mg/body	D1-5	点滴静注	300分間	21日間	

## M-VAC

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
メトトレキサート	30 mg/m <sup>2</sup>	D1.15.22	点滴静注	60分間	28日間	
ビンブラステチン	3 mg/m <sup>2</sup>	D2.15.22	点滴静注	全開投与		
ドキシルピシチン	30 mg/m <sup>2</sup>	D2	点滴静注	60分間		
シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>	D2	点滴静注	180分間		

## TG (PTX/GEM)

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
パクリタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	D1.8	点滴静注	180分間	28日間	
ゲムシタピン	700 mg/m <sup>2</sup>	D1.8	点滴静注	30分間		

## TIN

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
イホスファミド	1500 mg/m <sup>2</sup>	D1-3	点滴静注	240分間	28日間	
パクリタキセル	175 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	180分間		
ネダプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	180分間		

## ペムブロリズマブ (q3w)

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	

## ペムブロリズマブ (q6w)

2022年10月 NEW

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	400 mg/body	D1	点滴静注	30分間	42日間	

# 尿路上皮がん

## 【維持療法】アベルマブ

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アベルマブ	10 mg/kg	D1	点滴静注	60分間	14日間	GCもしくはGP終了後の維持療法

## エンホルツマブ バトチン

2022年10月 NEW

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
エンホルツマブ バトチン	1.25 mg/kg	D1,8,15	点滴静注	30分間	28日間	