

尿路上皮がん

GC (GEM/CBDCA)

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1.8	点滴静注	30分間	21日間	
カルボプラチン	AUC 4	D1	点滴静注	180分間		

GEM

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1.8.15	点滴静注	30分間	28日間	

GP(GEM/CDDP) q3w

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1.8	点滴静注	30分間	21日間	
シスプラチン	70 mg/m ²	D2	点滴静注	240分間		

GP (GEM/CDDP) q4w

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1.8.15	点滴静注	30分間	28日間	
シスプラチン	70 mg/m ²	D2	点滴静注	180分間		

Low-Dose CDDP (CRT)

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
シスプラチン	20 mg/body	D1-5	点滴静注	300分間	21日間	

M-VAC

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
メトトレキサート	30 mg/m ²	D1.15.22	点滴静注	60分間	28日間	
ビンブラスチン	3 mg/m ²	D2.15.22	点滴静注	全開投与		
ドキソルビシン	30 mg/m ²	D2	点滴静注	60分間		
シスプラチン	70 mg/m ²	D2	点滴静注	180分間		

TG (PTX/GEM)

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
パクリタキセル	70 mg/m ²	D1.8	点滴静注	180分間	28日間	
ゲムシタピン	700 mg/m ²	D1.8	点滴静注	30分間		

尿路上皮がん

TIN

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
イホスファミド	1500 mg/m ²	D1-3	点滴静注	240分間	28日間	
パクリタキセル	175 mg/m ²	D1	点滴静注	180分間		
ネダプラチン	70 mg/m ²	D1	点滴静注	180分間		

ペムブロリズマブ（q3w）

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	

ペムブロリズマブ（q6w）

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	400 mg/body	D1	点滴静注	30分間	42日間	

【維持療法】アベルマブ

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アベルマブ	10 mg/kg	D1	点滴静注	60分間	14日間	GCもしくはGP終了後の維持療法

エンホルツマブ ベトチン

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
エンホルツマブ ベトチン	1.25 mg/kg	D1,8,15	点滴静注	30分間	28日間	

ペムブロリズマブ+エンホルツマブ ベトチン

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	35コース終了後は 【維持療法】エンホルツマブ ベトチン へ移行
エンホルツマブ ベトチン	1.25 mg/kg	D1,8	点滴静注	30分間		

【維持療法】エンホルツマブ ベトチン

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
エンホルツマブ ベトチン	1.25 mg/kg	D1,8	点滴静注	30分間	21日間	

主な使用目的 進行再発

尿路上皮がん

【術後補助】ニボルマブ（q2w）			主な使用目的		術後補助	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	240 mg/body	D1	点滴静注	30分間	14 日間	

【術後補助】ニボルマブ（q4w）			主な使用目的		術後補助	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	480 mg/body	D1	点滴静注	30分間	28日間	