

# 小細胞肺がん

## AMR

主な使用目的 進行再発

| 使用薬剤   | 投与量                  | 投与日    | 投与経路 | 投与時間 | 1コース | 備考 |
|--------|----------------------|--------|------|------|------|----|
| アムルピシシ | 40 mg/m <sup>2</sup> | D1,2,3 | 点滴静注 | 10分間 | 21日間 |    |

## CBDCA/CPT-11

主な使用目的 進行再発

| 使用薬剤    | 投与量                  | 投与日     | 投与経路 | 投与時間 | 1コース | 備考 |
|---------|----------------------|---------|------|------|------|----|
| カルボプラチン | AUC 5                | D1      | 点滴静注 | 60分間 | 28日間 |    |
| イリノテカン  | 50 mg/m <sup>2</sup> | D1,8,15 | 点滴静注 | 90分間 |      |    |

## wCBDCA/PTX

主な使用目的 進行再発

| 使用薬剤    | 投与量                  | 投与日     | 投与経路 | 投与時間 | 1コース | 備考 |
|---------|----------------------|---------|------|------|------|----|
| カルボプラチン | AUC 2                | D1,8,15 | 点滴静注 | 60分間 | 28日間 |    |
| パクリタキセル | 80 mg/m <sup>2</sup> | D1,8,15 | 点滴静注 | 60分間 |      |    |

## CBDCA/VP-16

主な使用目的 進行再発

| 使用薬剤    | 投与量                   | 投与日    | 投与経路 | 投与時間  | 1コース | 備考 |
|---------|-----------------------|--------|------|-------|------|----|
| カルボプラチン | AUC 5                 | D1     | 点滴静注 | 60分間  | 21日間 |    |
| エトポシド   | 100 mg/m <sup>2</sup> | D1,2,3 | 点滴静注 | 120分間 |      |    |

## 【透析患者用】CBDCA/VP-16

主な使用目的 進行再発

| 使用薬剤    | 投与量                   | 投与日  | 投与経路 | 投与時間 | 1コース | 備考 |
|---------|-----------------------|------|------|------|------|----|
| カルボプラチン | 300 mg/m <sup>2</sup> | D1   | 点滴静注 | 60分間 | 21日間 |    |
| エトポシド   | 50 mg/m <sup>2</sup>  | D1,3 | 点滴静注 | 60分間 |      |    |

## CDDP/CPT-11

主な使用目的 進行再発

| 使用薬剤   | 投与量                  | 投与日     | 投与経路 | 投与時間  | 1コース | 備考 |
|--------|----------------------|---------|------|-------|------|----|
| シスプラチン | 60 mg/m <sup>2</sup> | D1      | 点滴静注 | 120分間 | 28日間 |    |
| イリノテカン | 60 mg/m <sup>2</sup> | D1,8,15 | 点滴静注 | 90分間  |      |    |

## CDDP/VP-16

主な使用目的 進行再発

| 使用薬剤   | 投与量                   | 投与日    | 投与経路 | 投与時間  | 1コース | 備考 |
|--------|-----------------------|--------|------|-------|------|----|
| シスプラチン | 80 mg/m <sup>2</sup>  | D1     | 点滴静注 | 120分間 | 21日間 |    |
| エトポシド  | 100 mg/m <sup>2</sup> | D1,2,3 | 点滴静注 | 120分間 |      |    |

## NGT

主な使用目的 進行再発

| 使用薬剤  | 投与量                 | 投与日  | 投与経路 | 投与時間 | 1コース | 備考 |
|-------|---------------------|------|------|------|------|----|
| ノゲテカン | 1 mg/m <sup>2</sup> | D1-5 | 点滴静注 | 30分間 | 21日間 |    |

# 小細胞肺がん

## アテゾリズマブ+CBDCA/VP-16

主な使用目的 進行再発

| 使用薬剤    | 投与量                   | 投与日    | 投与経路 | 投与時間  | 1コース | 備考                                   |
|---------|-----------------------|--------|------|-------|------|--------------------------------------|
| アテゾリズマブ | 1200 mg/body          | D1     | 点滴静注 | 60分間  | 21日間 | 4コース終了時に奏功していれば、<br>【維持療法】アテゾリズマブへ移行 |
| エトボシド   | 100 mg/m <sup>2</sup> | D1,2,3 | 点滴静注 | 120分間 |      |                                      |
| カルボプラチン | AUC 5                 | D1     | 点滴静注 | 60分間  |      |                                      |

## 【維持療法】アテゾリズマブ

主な使用目的 進行再発

| 使用薬剤    | 投与量          | 投与日 | 投与経路 | 投与時間 | 1コース | 備考 |
|---------|--------------|-----|------|------|------|----|
| アテゾリズマブ | 1200 mg/body | D1  | 点滴静注 | 60分間 | 21日間 |    |

## デュルバルマブ+CBDCA/VP-16

主な使用目的 進行再発

| 使用薬剤                  | 投与量                   | 投与日    | 投与経路 | 投与時間  | 1コース | 備考                                   |
|-----------------------|-----------------------|--------|------|-------|------|--------------------------------------|
| デュルバルマブ<br>(体重30kg超)  | 1500 mg/body          | D1     | 点滴静注 | 60分間  | 21日間 | 4コース終了時に奏功していれば、<br>【維持療法】デュルバルマブへ移行 |
| デュルバルマブ<br>(体重30kg以下) | 20 mg/kg              | D1     | 点滴静注 | 60分間  |      |                                      |
| エトボシド                 | 100 mg/m <sup>2</sup> | D1,2,3 | 点滴静注 | 120分間 |      |                                      |
| カルボプラチン               | AUC 5                 | D1     | 点滴静注 | 60分間  |      |                                      |

## デュルバルマブ+CDDP/VP-16

主な使用目的 進行再発

| 使用薬剤                  | 投与量                   | 投与日    | 投与経路 | 投与時間  | 1コース | 備考                                   |
|-----------------------|-----------------------|--------|------|-------|------|--------------------------------------|
| デュルバルマブ<br>(体重30kg超)  | 1500 mg/body          | D1     | 点滴静注 | 60分間  | 21日間 | 4コース終了時に奏功していれば、<br>【維持療法】デュルバルマブへ移行 |
| デュルバルマブ<br>(体重30kg以下) | 20 mg/kg              | D1     | 点滴静注 | 60分間  |      |                                      |
| エトボシド                 | 100 mg/m <sup>2</sup> | D1,2,3 | 点滴静注 | 120分間 |      |                                      |
| シスプラチン                | 80 mg/m <sup>2</sup>  | D1     | 点滴静注 | 120分間 |      |                                      |

## 【維持療法】デュルバルマブ

主な使用目的 進行再発

| 使用薬剤                  | 投与量          | 投与日 | 投与経路 | 投与時間 | 1コース | 備考 |
|-----------------------|--------------|-----|------|------|------|----|
| デュルバルマブ<br>(体重30kg超)  | 1500 mg/body | D1  | 点滴静注 | 60分間 | 28日間 |    |
| デュルバルマブ<br>(体重30kg以下) | 20 mg/kg     | D1  | 点滴静注 | 60分間 |      |    |