

胆道がん

進行再発

GCS

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1	点滴静注	30分間	14日間	
シスプラチン	25 mg/m ²	D1	点滴静注	60分間		
S1	※添付文書参照	D1-7	経口	分2		

GEM/CDDP

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
シスプラチン	25 mg/m ²	D1,8	点滴静注	60分間	21日間	
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1,8	点滴静注	30分間		

GEM

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	30分間	28日間	

GS

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1,8	点滴静注	30分間	21日間	【S1用量】 BSA < 1.25 : 60mg/日 1.25 ≤ BSA < 1.5 : 80mg/日 BSA ≥ 1.5 : 100mg/日
S1	※備考参照	D1-14	経口	分2		

S1/GEM (1,15)

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1,15	点滴静注	30分間	28日間	
S1	※添付文書参照	D1-14	経口	分2		

デュルバルマブ+GEM/CDDP

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ (体重30kg超)	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	8コース終了時に奏功していれば、 【維持療法】デュルバルマブへ移行
デュルバルマブ (体重30kg以下)	20 mg/kg	D1	点滴静注	60分間		
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1,8	点滴静注	30分間		
シスプラチン	25 mg/m ²	D1,8	点滴静注	60分間		

胆道がん

【維持療法】デュルバルマブ

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ (体重30kg超)	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	28日間	
デュルバルマブ (体重30kg以下)	20 mg/kg	D1	点滴静注	60分間		

ペムブロリズマブ(q3w)+GEM/CDDP

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	最大8コースまで 奏功していれば、 【維持療法】ペムブロリズマブ+GEMへ 移行
シスプラチン	25 mg/m ²	D1,8	点滴静注	60分間		
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1,8	点滴静注	30分間		

【維持】ペムブロリズマブ(q3w)+GEM

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1,8	点滴静注	30分間		

ペムブロリズマブ(q6w)+GEM/CDDP

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	400 mg/body	D1	点滴静注	30分間	42日間	最大4コースまで 奏功していれば、【維持療法】 ペムブロリズマブ(q6w)+GEMへ 移行
シスプラチン	25 mg/m ²	D1,8, 22,29	点滴静注	1時間		
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1,15, 22,29	点滴静注	30分間		

【維持】ペムブロリズマブ(q6w)+GEM

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	400 mg/body	D1	点滴静注	30分間	42日間	
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1,8, 22,29	点滴静注	30分間		