

ホジキンリンパ腫

ABVd

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ドキシソルピシシ	25 mg/m ²	D1,15	点滴静注	30分間	28日間	
プレオマイシシ	9 mg/m ²	D1,15	点滴静注	30分間		
ビンブラスチシ	6 mg/m ²	D1,15	点滴静注	全開投与		
ダカルバジシ	250 mg/m ²	D1,15	点滴静注	120分間		

ABVD

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ドキシソルピシシ	25 mg/m ²	D1,15	点滴静注	30分間	28日間	
プレオマイシシ	9 mg/m ²	D1,15	点滴静注	30分間		
ビンブラスチシ	6 mg/m ²	D1,15	点滴静注	全開投与		
ダカルバジシ	375 mg/m ²	D1,15	点滴静注	120分間		

A+AVD

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ドキシソルピシシ	25 mg/m ²	D1,15	点滴静注	30分間	28日間	
ビンブラスチシ	6 mg/m ²	D1,15	点滴静注	全開投与		
ダカルバジシ	375 mg/m ²	D1,15	点滴静注	120分間		
ブレンツキシマブ ヘドチシ	1.2 mg/kg	D1,15	点滴静注	30分間		

Brentuximab

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ブレンツキシマブ ヘドチシ	1.8 mg/kg	D1	点滴静注	60分間	21日間	