

# 食道がん

## 周術期

### FP(800/80 術後補助)

主な使用目的 術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	240分間	28日間	
フルオロウラシル	800 mg/m <sup>2</sup>	D1-5	点滴静注	24時間		

### DCF

主な使用目的 術前補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ドセタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	60分間	21日間	
シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		
フルオロウラシル	750 mg/m <sup>2</sup>	D1-5	点滴静注	24時間		

### FP(800/80 術前補助)

主な使用目的 術前補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間	21日間	
フルオロウラシル	800 mg/m <sup>2</sup>	D1-5	点滴静注	24時間		

## 進行再発

### bDCF

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ドセタキセル	30 mg/m <sup>2</sup>	D1,15	点滴静注	60分間	28日間	
シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		
フルオロウラシル	800 mg/m <sup>2</sup>	D1-5	点滴静注	24時間		

### CDGP/DTX (q4w)

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	60分間	28日間	
ネダプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		

### CDGP/DTX (q2w)

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ドセタキセル	30 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	60分間	14日間	
ネダプラチン	40 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	90分間		

### DTX

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ドセタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	60分間	21日間	

### FP(700/70 放射線併用)

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	240分間	28日間	
フルオロウラシル	700 mg/m <sup>2</sup>	D1-4	点滴静注	24時間		

### FP(700/70)

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	240分間	21日間	
フルオロウラシル	700 mg/m <sup>2</sup>	D1-5	点滴静注	24時間		

# 食道がん

mFOLFOX6 主な使用目的 進行再発 2023年4月NEW

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
レボリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間	14日間	CVポート レボリナートとオキサリプラチンは同時投与 携帯型インフューザーポンプ使用
オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		
フルオウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	全開投与		
フルオウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	46時間		

weekly PTX 主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
バクリタキセル	100 mg/m <sup>2</sup>	D1,8,15,22,29,36	点滴静注	60分間	49日間	

【①-⑥】ヘムプロリスマブ+FP (800/80) 主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ヘムプロリスマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	
フルオウラシル	800 mg/m <sup>2</sup>	D1-5	点滴静注	24時間		
シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		

【⑦以降】ヘムプロリスマブ+FP (800/80) 主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ヘムプロリスマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	
フルオウラシル	800 mg/m <sup>2</sup>	D1-5	点滴静注	24時間		

ニボルマブ (q2w) 主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	240 mg/body	D1	点滴静注	30分間	14日間	

ニボルマブ (q4w) 主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	480 mg/body	D1	点滴静注	30分間	28日間	