

# 胆道がん

## 進行再発

### GCS

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	30分間	14日間	
シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	60分間		
S1	下記参照※1	D1-7	経口	分2		

### GEM/CDDP

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	D1,8	点滴静注	60分間	21日間	
ゲムシタピン	1000 mg/m <sup>2</sup>	D1,8	点滴静注	30分間		

### GEM

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m <sup>2</sup>	D1,8,15	点滴静注	30分間	28日間	

### GS

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m <sup>2</sup>	D1,8	点滴静注	30分間	21日間	
S1	下記参照※2	D1-14	経口	分2		

### S1/GEM (1,15)

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m <sup>2</sup>	D1,15	点滴静注	30分間	28日間	
S1	下記参照※1	D1-14	経口	分2		

### デュルバルマブ+GEM/CDDP

主な使用目的 進行再発

2023年4月 NEW

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ (体重30kg超)	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	8コース終了時に奏功していれば、 【維持療法】デュルバルマブへ移行
デュルバルマブ (体重30kg以下)	20 mg/kg	D1	点滴静注	60分間		
ゲムシタピン	1000 mg/m <sup>2</sup>	D1,8	点滴静注	30分間		
シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	D1,8	点滴静注	60分間		

### 【維持療法】デュルバルマブ

主な使用目的 進行再発

2023年4月 NEW

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ (体重30kg超)	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	28日間	
デュルバルマブ (体重30kg以下)	20 mg/kg	D1	点滴静注	60分間		

#### ※1 S1用量

体表面積	1日投与量
1.25m <sup>2</sup> 未満	80mg
1.25m <sup>2</sup> ～1.5m <sup>2</sup> 未満	100mg
1.5m <sup>2</sup> 以上	120mg

#### ※2 S1用量 (通常と異なります)

体表面積	1日投与量
1.25m <sup>2</sup> 未満	60mg (朝40～夕20)
1.25m <sup>2</sup> ～1.5m <sup>2</sup> 未満	80mg
1.5m <sup>2</sup> 以上	100mg