

乳がん

周術期

EC（90/600）

主な使用目的					術前補助	術後補助
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
エビルピシン	90 mg/m ²	D1	点滴静注	全開投与	21日間	原則4コース実施
シクロホスファミド	600 mg/m ²	D1	点滴静注	30分間		

dose-dense EC

主な使用目的					術前補助	術後補助
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
エビルピシン	90 mg/m ²	D1	点滴静注	全開投与	14日間	原則4コース実施 peg-G-CSF併用
シクロホスファミド	600 mg/m ²	D1	点滴静注	30分間		

AC（60/600）

主な使用目的					術前補助	術後補助
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ドキシルピシン	60 mg/m ²	D1	点滴静注	全開投与	21日間	原則4コース実施
シクロホスファミド	600 mg/m ²	D1	点滴静注	30分間		

TC（DTX/CPA）

主な使用目的					術後補助	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ドセタキセル	75 mg/m ²	D1	点滴静注	60分間	21日間	原則4コース実施
シクロホスファミド	600 mg/m ²	D1	点滴静注	60分間		

乳がん

DTX

DTX			主な使用目的		術前補助	術後補助
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ドセタキセル	75 mg/m ²	D1	点滴静注	60分間	21日間	原則4コース実施

dose-dense PTX

dose-dense PTX			主な使用目的		術前補助	術後補助
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
パクリタキセル	175 mg/m ²	D1	点滴静注	180分間	14日間	原則4コース実施 peg-G-CSF併用

wPTX

WPTX			主な使用目的		術前補助	術後補助
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
パクリタキセル	80 mg/m ²	D1	点滴静注	60分間	7日間	原則12コース実施

HP + DTX

HP + DTX			主な使用目的		術前補助	術後補助	
使用薬剤	投与量		投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ベルツズマブ（初回）	840	mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	HER2陽性症例 原則4コース実施
ベルツズマブ（2回目以降）	420	mg/body					
トラスツズマブ（初回）	8	mg/kg	D1	点滴静注	90分間		
トラスツズマブ（2回目以降）	6	mg/kg					
ドセタキセル	75	mg/m ²	D1	点滴静注	60分間		

HP + wPTX

HP + wPTX		主な使用目的					術前補助	術後補助
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考		
ベルツズマブ（初回）	840 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	HER2陽性症例 原則4コース実施		
ベルツズマブ（2回目以降）	420 mg/body							
トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間				
トラスツズマブ（2回目以降）	6 mg/kg							
パクリタキセル	80 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	60分間				

乳がん

HP

主な使用目的

術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ベルツズマブ（初回）	840 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	HER2陽性症例 原則13コース実施 （抗HER2療法として1年間）
ベルツズマブ （2回目以降）	420 mg/body					
トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間		
トラスツズマブ （2回目以降）	6 mg/kg					

フェスゴ配合皮下注

主な使用目的

術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
フェスゴ配合皮下注IN	初回投与	D1	皮下注	8分間	21日間	HER2陽性症例 前回投与から6週間以上のときには、 フェスゴ配合皮下注INから再開
フェスゴ配合皮下注MA	維持投与	D1	皮下注	5分間		

T-DM1

主な使用目的

術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブエムタンシン	3.6 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2陽性症例 原則14コースまで （抗HER2療法として1年間）

乳がん

HER+ DTX

主な使用目的					術前補助	術後補助
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2陽性症例 原則4コース実施
トラスツズマブ （2回目以降）	6 mg/kg					
ドセタキセル	75 mg/m ²	D1	点滴静注	60分間		

wHER+ PTX

主な使用目的					術前補助	術後補助
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ（初回）	4 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	7日間	HER2陽性症例 原則12コース実施
トラスツズマブ （2回目以降）	2 mg/kg					
パクリタキセル	80 mg/m ²	D1	点滴静注	60分間		

HER

主な使用目的					術後補助	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2陽性症例 原則13コース実施 （抗HER2療法として1年間）
トラスツズマブ （2回目以降）	6 mg/kg					

ペムブロリズマブ+EC

主な使用目的					術前補助	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	トリプルネガティブ乳がん
エビルピシン	90 mg/m ²	D1	点滴静注	全開投与		
シクロホスファミド	600 mg/m ²	D1	点滴静注	30分間		

ペムブロリズマブ+wCBDCA/wPTX

主な使用目的					術前補助	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	トリプルネガティブ乳がん
カルボプラチン	AUC 1.5	D1,8,15	点滴静注	1時間		
パクリタキセル	80 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	1時間		

乳がん

ペムブロリズマブ（q6w）

主な使用目的

術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	400 mg/body	D1	点滴静注	30分間	42日間	

乳がん

進行再発

BEV/wPTX

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ヘパシズマブ	10 mg/kg	D1,15	点滴静注	90分間	28日間	
パクリタキセル	80 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	60分間		

CPT-11 (A)

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
イリノテカン	100 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	90分間	28日間	

DTX

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ドセタキセル	75 mg/m ²	D1	点滴静注	60分間	21日間	

EC (75/600)

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
エビルピシン	75 mg/m ²	D1	点滴静注	全開投与	21日間	
シクロホスファミド	600 mg/m ²	D1	点滴静注	30分間		

Eribulin

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
エリブリン	1.4 mg/m ²	D1,8	点滴静注	全開投与	21日間	

GEM

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1250 mg/m ²	D1,8	点滴静注	30分間	21日間	

nab-PTX

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アルブミン懸濁型 パクリタキセル	260 mg/m ²	D1	点滴静注	30分間	21日間	

乳がん

VNR

		主な使用目的			進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ビンレルビン	25 mg/m ²	D1,8	点滴静注	全開投与	21日間	

wPTX

		主な使用目的			進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
パクリタキセル	80 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	60分間	28日間	

アテゾリズマブ/nab-PTX

		主な使用目的			進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アテゾリズマブ	840 mg/body	D1,15	点滴静注	60分間	28日間	PD-L1陽性の トリプルネガティブ乳がん
アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	30分間		

ペムブロリズマブ + GEM/CBDCA

		主な使用目的			進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	PD-L1陽性の トリプルネガティブ乳がん
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1,8	点滴静注	30分間		
カルボプラチン	AUC 2	D1,8	点滴静注	60分間		

HER+ Cape（B法）

		主な使用目的			進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2陽性症例
トラスツズマブ （2回目以降）	6 mg/kg					
カベシタピン	B法（※添付文書参照）	D1-14	経口	分2		

乳がん

HER+ Eribulin

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2陽性症例
トラスツズマブ （2回目以降）	6 mg/kg					
エリブリン	1.4 mg/m ²	D1,8	点滴静注	全開投与		

HER+ S1

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2陽性症例
トラスツズマブ （2回目以降）	6 mg/kg					
S1	※添付文書参照	D1-14	経口	分2		

HER+ VNR

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2陽性症例
トラスツズマブ （2回目以降）	6 mg/kg					
ビンレルビン	25 mg/m ²	D1,8	点滴静注	全開投与		

HER

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2陽性症例
トラスツズマブ （2回目以降）	6 mg/kg					

乳がん

HP + Cape（B法）

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量		投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ベルツズマブ（初回）	840	mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	HER2陽性症例
ベルツズマブ（2回目以降）	420	mg/body					
トラスツズマブ（初回）	8	mg/kg	D1	点滴静注	90分間		
トラスツズマブ（2回目以降）	6	mg/kg					
カベシタピン	B法（※添付文書参照）		D1-14	経口	分2		

HP + DTX

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量		投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ベルツズマブ（初回）	840	mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	HER2陽性症例
ベルツズマブ（2回目以降）	420	mg/body					
トラスツズマブ（初回）	8	mg/kg	D1	点滴静注	90分間		
トラスツズマブ（2回目以降）	6	mg/kg					
ドセタキセル	75	mg/m ²	D1	点滴静注	60分間		

HP + Eribulin

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量		投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ベルツズマブ（初回）	840	mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	HER2陽性症例
ベルツズマブ（2回目以降）	420	mg/body					
トラスツズマブ（初回）	8	mg/kg	D1	点滴静注	90分間		
トラスツズマブ（2回目以降）	6	mg/kg					
エリブリン	1.4	mg/m ²	D1,8	点滴静注	全開投与		

乳がん

HP+VNR

HP + VNR			主な使用目的			進行再発	
使用薬剤	投与量		投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペルツズマブ（初回）	840	mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	HER2陽性症例
ペルツズマブ（2回目以降）	420	mg/body					
トラスツズマブ（初回）	8	mg/kg	D1	点滴静注	90分間		
トラスツズマブ（2回目以降）	6	mg/kg					
ビンレルビン	25	mg/m ²	D1,8	点滴静注	全開投与		

HP

HP			主な使用目的		進行再発		
使用薬剤	投与量		投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ベルツズマブ（初回）	840	mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	HER2陽性症例
ベルツズマブ（2回目以降）	420	mg/body					
トラスツズマブ（初回）	8	mg/kg	D1	点滴静注	90分間		
トラスツズマブ（2回目以降）	6	mg/kg					

フェスゴ配合皮下注

フェスゴ配合皮下注			主な使用目的		進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
フェスゴ配合皮下注IN	初回投与	D1	皮下注	8分間	21日間	HER2陽性症例
フェスゴ配合皮下注MA	維持投与	D1	皮下注	5分間		前回投与から6週間以上のときには、フェスゴ配合皮下注INから再開

T-DM1

T-DM1			主な使用目的		進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブエムタンシン	3.6 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2陽性症例

T-Dxd（医師限定）

T-DXd（医師限定）			主な使用目的		進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ デルクステカン	5.4 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2陽性症例

サシツズマブ ゴビテカン

サシツズマブ ゴビテカン			主な使用目的		進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
サシツズマブ ゴビテカン	10 mg/kg	D1,8	点滴静注	3時間	21日間	HER2陰性症例

乳がん

HER+ Cape（C法）+ ツカチニブ

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量		投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ（初回）	8	mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2陽性症例
トラスツズマブ（2回目以降）	6	mg/kg					
カベシタピン	C法（※添付文書参照）		D1-14	経口	分2		
ツカチニブ	600 mg/body		連日	経口	分2		