

## 更新分レジメン（2023年5月～2024年3月追加分）

### 頭頸部がん

#### ヘムブロシマブ+FP

使用薬剤	投与量	投与日	主な使用目的		進行再発		備考
			投与経路	投与時間	1コース		
ヘムブロシマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間		
シスプラチン	100 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間			
フルオウラシル	1000 mg/m <sup>2</sup>	D1-4	点滴静注	24時間			

### 食道がん

#### ニボルマブ（q2w）+イビリムマブ

使用薬剤	投与量	投与日	主な使用目的		進行再発		備考
			投与経路	投与時間	1コース		
ニボルマブ	240 mg/body	D1,15,29	点滴静注	30分間	42日間		
イビリムマブ	1 mg/kg	D1	点滴静注	30分間			

#### mFOLFOX6+RT（放射線療法）

使用薬剤	投与量	投与日	主な使用目的		進行再発		備考
			投与経路	投与時間	1コース		
レボリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間	14日間	持続投与フルオウラシルの用量が通常のmFOLFOX6と異なる レボリナートとオキサリプラチンは同時投与 CVポート 携帯型インフューザーポンプ使用	
オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間			
フルオウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	全期投与			
フルオウラシル	1600 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	46時間			

### 胃がん

#### ニボルマブ（q4w）

使用薬剤	投与量	投与日	主な使用目的		進行再発		備考
			投与経路	投与時間	1コース		
ニボルマブ	480 mg/body	D1	点滴静注	30分間	28日間		

### 大腸がん

#### C-mab（q2w）+CPT-11

使用薬剤	投与量	投与日	主な使用目的		進行再発		備考
			投与経路	投与時間	1コース		
セツキシマブ	500 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間	14日間	RAS遺伝子野生型	
イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	90分間			

#### C-mab（q2w）+FOLFIRI

使用薬剤	投与量	投与日	主な使用目的		進行再発		備考
			投与経路	投与時間	1コース		
セツキシマブ	500 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間	14日間	RAS遺伝子野生型 CVポート レボリナートとイリノテカンは同時投与 携帯型インフューザーポンプ使用	
レボリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間			
イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間			
フルオウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	全期投与			
フルオウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	46時間			

#### C-mab（q2w）+mFOLFOX6

使用薬剤	投与量	投与日	主な使用目的		進行再発		備考
			投与経路	投与時間	1コース		
セツキシマブ	500 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間	14日間	RAS遺伝子野生型 CVポート レボリナートとオキサリプラチンは同時投与 携帯型インフューザーポンプ使用	
レボリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間			
オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間			
フルオウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	全期投与			
フルオウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	46時間			

## 更新分レジメン（2023年5月～2024年3月追加分）

### 肝細胞がん

#### デュルバルマブ単剤療法

使用薬剤	投与量	投与日	主な使用目的		進行再発		備考
			投与経路	投与時間	1コース		
デュルバルマブ (体重30kg超)	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	28日間		
デュルバルマブ (体重30kg以下)	20 mg/kg	D1	点滴静注	60分間			

#### ① デュルバルマブ+トレメリムマブ

使用薬剤	投与量	投与日	主な使用目的		進行再発		備考
			投与経路	投与時間	1コース		
デュルバルマブ (体重30kg超)	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	28日間	①コース終了後は、 「②以降 デュルバルマブ維持療法」へ移行する	
デュルバルマブ (体重30kg以下)	20 mg/kg						
トレメリムマブ (体重30kg超)	300 mg/body	D1	点滴静注	60分間			
トレメリムマブ (体重30kg以下)	4 mg/kg						

#### ②以降 デュルバルマブ維持療法

使用薬剤	投与量	投与日	主な使用目的		進行再発		備考
			投与経路	投与時間	1コース		
デュルバルマブ (体重30kg超)	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	28日間		
デュルバルマブ (体重30kg以下)	20 mg/kg	D1	点滴静注	60分間			

### その他：神経内分泌腫瘍

#### CBDCA/CPT-11

使用薬剤	投与量	投与日	主な使用目的		進行再発		備考
			投与経路	投与時間	1コース		
カルボプラチン	AUC 5	D1	点滴静注	60分間	28日間		
イリリテカン	50 mg/m <sup>2</sup>	D1,8,15	点滴静注	90分間			

### 乳がん（術後）

#### フェスコ配合皮下注

使用薬剤	投与量	投与日	主な使用目的		術後補助		備考
			投与経路	投与時間	1コース		
フェスコ配合皮下注IN	初回投与	D1	皮下注	8分間	21日間	HER2陽性症例 前回投与から6週間以上のおときには、 フェスコ配合皮下注INから再開	
フェスコ配合皮下注MA	維持投与	D1	皮下注	5分間			

### 乳がん（進行再発）

#### フェスコ配合皮下注

使用薬剤	投与量	投与日	主な使用目的		進行再発		備考
			投与経路	投与時間	1コース		
フェスコ配合皮下注IN	初回投与	D1	皮下注	8分間	21日間	HER2陽性症例 前回投与から6週間以上のおときには、 フェスコ配合皮下注INから再開	
フェスコ配合皮下注MA	維持投与	D1	皮下注	5分間			

# 更新分レジメン（2023年5月～2024年3月追加分）

## 非小細胞肺癌

### [CRT後]デュルバルマブ維持療法

使用薬剤	投与量	投与日	主な使用目的		進行再発		備考
			投与経路	投与時間	1コース		
デュルバルマブ (体重30kg超)	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	28日間	wCBDCA/PTX conc TRT後の 地固め療法	最大13コース（1年間）まで ※添付文書改訂による用法用量変更
デュルバルマブ (体重30kg以下)	20 mg/kg	D1	点滴静注	60分間			

### ①-④ Durva+Treme+ CBDCA/PEM

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
トレメリムマブ	75 mg/body	D1	点滴静注	60分間		
カルボプラチン	AUC 5	D1	点滴静注	60分間		
ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	10分間		

### ⑤、⑦以降 Durva+PEM（Durva+Treme+ CBDCA/PEM）

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	28日間	葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	10分間		

### ⑥ Durva+Treme+PEM（Durva+Treme+ CBDCA/PEM）

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	28日間	葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
トレメリムマブ	75 mg/body	D1	点滴静注	60分間		
ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	10分間		

### ①-④ Durva+Treme+ CDDP/PEM

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
トレメリムマブ	75 mg/body	D1	点滴静注	60分間		
シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		
ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	10分間		

### ⑤、⑦以降 Durva+PEM（Durva+Treme+ CDDP/PEM）

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	28日間	葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	10分間		

### ⑥ Durva+Treme+PEM（Durva+Treme+ CDDP/PEM）

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	28日間	葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
トレメリムマブ	75 mg/body	D1	点滴静注	60分間		
ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	10分間		

### ①-④ Durva+Treme+ CBDCA/nab-PTX

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	
トレメリムマブ	75 mg/body	D1	点滴静注	60分間		
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100 mg/m <sup>2</sup>	D1,8,15	点滴静注	30分間		
カルボプラチン	AUC 6	D1	点滴静注	60分間		

### ⑤、⑦以降 Durva（Durva+Treme+ CBDCA/nab-PTX）

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	28日間	

### ⑥ Durva+Treme（Durva+Treme+ CBDCA/nab-PTX）

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	28日間	
トレメリムマブ	75 mg/body	D1	点滴静注	60分間		

## 更新分レジメン（2023年5月～2024年3月追加分）

### 非ホジキンリンパ腫

#### Pola-BR

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	医師指示	21日間	状況によって薬剤投与日・投与順番の変更あり
ホリツマブ	1.8 mg/kg	D2	点滴静注	90分間		
ベンダムスチン	90 mg/m <sup>2</sup>	D2-3	点滴静注	60分間		

#### Pola-RCHP

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	医師指示	21日間	状況によって薬剤投与日・投与順番の変更あり プレドニゾン内服はD2のPola-CHP投与日の翌日から5日間 ※Pola-CHPは前投薬にプレドニンを点滴投与している。点滴・内服合わせて合計5日間
ホリツマブ	1.8 mg/kg	D2	点滴静注	90分間		
シクロホスファミド	750 mg/m <sup>2</sup>	D2	点滴静注	120分間		
ドキシルピシン	50 mg/m <sup>2</sup>	D2	点滴静注	30分間		
プレドニゾン	100 mg/body	D3-6	経口	1日2回		

### 多発性骨髄腫

#### mVRd-Lite

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	D1,8,15,22	皮下注		28日間	移植前導入治療として他院からの依頼で使用
レナリドミド	15-25 mg/body	D1-21	経口	1日1回		
デキサメタゾン	20 mg/body	D1,2,8,9,15,16,22,23	経口	1日1回		

### 白血病

#### LDAC (Low-Dose Ara-C) / ヘネトクラクス

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
シタラビン	20 mg/m <sup>2</sup>	D1-10	皮下注		28日間	休日等により投与日程変更あり
ヘネトクラクス	100-600 mg/body	連日	経口	1日1回		

### 造血器腫瘍（その他）

#### ①-② DCyBorD <原発性アミロイドーシス>

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ダラツムマブ	1800 mg/body	D1,8,15,22	皮下注		28日間	
ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	D1,8,15,22	皮下注			
シクロホスファミド	300 mg/m <sup>2</sup>	D1,8,15,22	経口	1日1回		
デキサメタゾン	20 mg/body	D1,2,8,9,15,16,22,23	経口	1日1回		

#### ③-⑥ DCyBorD <原発性アミロイドーシス>

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ダラツムマブ	1800 mg/body	D1,15	皮下注		28日間	
ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	D1,8,15,22	皮下注			
シクロホスファミド	300 mg/m <sup>2</sup>	D1,8,15,22	経口	1日1回		
デキサメタゾン	20 mg/body	D1,2,8,9,15,16,22,23	経口	1日1回		

#### ⑦以降 DCyBorD <原発性アミロイドーシス>

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ダラツムマブ	1800 mg/body	D1	皮下注		28日間	