

更新分（2025年11月～2026年7月）

胃がん

【術前】SOX

		主な使用目的			術前補助	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
オキサリプラチン	130 mg/m ²	D1	点滴静注	2時間	21日間	3コースまで
S1	80-120 mg/body	D1-14	経口	1日2回		

【術前】DOS

		主な使用目的			術前補助	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ドセタキセル	40 mg/m ²	D1	点滴静注	1時間	21日間	3コースまで
オキサリプラチン	100 mg/m ²	D1	点滴静注	2時間		
S1	80-120 mg/body	D1-14	経口	1日2回		

ゾルベツキシマブ/CAPOX

		主な使用目的			進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゾルベツキシマブ （初回）	800 mg/m ²	D1	点滴静注	医師指示	21日間	CLDN18.2陽性の場合
ゾルベツキシマブ （2回目以降）	600 mg/m ²					
オキサリプラチン	130 mg/m ²	D1	点滴静注	2時間		
カベシタピン	C法（※添付文書参照）	D1-14	経口	1日2回		

ペムブロリズマブ+HER/CAPOX(XELOX)

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カベシタピン	C法（※添付文書参照）	D1-14	経口	分2	21日間	HER2陽性 かつ PD-L1 CPS ≥1の症例
ペムブロリズマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間		
トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間		
トラスツズマブ （2回目以降）	6 mg/kg					
オキサリプラチン	130 mg/m ²	D1	点滴静注	2時間		

大腸がん

ソトラシブ+P-mab

		主な使用目的			進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
パニツムマブ	6 mg/kg	D1	点滴静注	1時間	14日間	KRAS G12C 陽性症例
ソトラシブ	960 mg/body	連日	経口	1日1回		

エンコラフェニブ+C-mab（q2w）/mFOLFOX6

		主な使用目的			進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
セツキシマブ	500 mg/m ²	D1	点滴静注	2時間	14日間	BRAF遺伝子変異陽性症例
レボホリナート	200 mg/m ²	D1	点滴静注	2時間		CVポート
オキサリプラチン	85 mg/m ²	D1	点滴静注	2時間		レボホリナートとオキサリプラチンは 同時投与

更新分（2025年11月～2026年7月）

フルオロウラシル	400 mg/m ²	D1	点滴静注	全開投与	AT-100	携帯型インフューザーポンプ使用
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	D1	点滴静注	46時間		
エンコラフェニブ	300 mg/body	連日	経口	1日1回		

【MSI-H】イピリマブ＋ニボルマブ					主な使用目的	進行再発
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	240 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	4コース実施後に【MSI-H】ニボルマブ（q4w）へ移行
イピリマブ	1 mg/kg	D1	点滴静注	30分間		

【MSI-H】ニボルマブ（q4w）					主な使用目的	進行再発
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	480 mg/body	D1	点滴静注	30分間	28日間	【MSI-H】イピリマブ＋ニボルマブの維持療法

食道がん

【術後】ニボルマブ（q4w）					主な使用目的	術後補助
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	480 mg/body	D1	点滴静注	30分間	28日間	最長12ヶ月間

非小細胞肺癌

【術後（q4w）】アテゾリズマブ					主な使用目的	術後補助
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アテゾリズマブ	1680 mg/body	D1	点滴静注	1時間	28日間	CDDP併用の術後補助レジメン使用後最長1年間

T-DXd					主な使用目的	進行再発
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ デルクステカン	5.4 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2遺伝子変異陽性症例

【単剤（q4w）】アテゾリズマブ					主な使用目的	進行再発
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アテゾリズマブ	1680 mg/body	D1	点滴静注	1時間	28日間	

【維持（q4w）】アテゾリズマブ					主な使用目的	進行再発
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アテゾリズマブ	1680 mg/body	D1	点滴静注	1時間	28日間	アテゾリズマブ＋CBDCA/nab-PTX 4-6コース後の維持療法

小細胞肺癌

【維持（q4w）】アテゾリズマブ					主な使用目的	進行再発
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アテゾリズマブ	1680 mg/body	D1	点滴静注	1時間	28日間	アテゾリズマブ＋CBDCA/VP-16 4コース後の維持療法

更新分（2025年11月～2026年7月）

CPT-11(A)		主な使用目的			進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
イリノテカン	100 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	90分間	28日間	

呼吸器内科（その他：胸腺がん）

アテゾリズマブ + CBDCA/PTX		主な使用目的			進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アテゾリズマブ	1200 mg/body	D1	点滴静注	1時間	21日間	4-6コースまで その後、 【維持（q3w）】アテゾリズマブへ移行
パクリタキセル	200 mg/m ²	D1	点滴静注	3時間		
カルボプラチン	AUC 6	D1	点滴静注	1時間		

【維持（q3w）】アテゾリズマブ		主な使用目的			進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アテゾリズマブ	1200 mg/body	D1	点滴静注	1時間	21日間	アテゾリズマブ + CBDCA/PTX 4-6コース後の維持療法

尿路上皮がん

【術前補助 体重30kg以上】デュルバルマブ + GEM/CDDP		主な使用目的			術前補助	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ	1500 mg/body	D1	点滴静注	1時間	21日間	術前に4コース
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1,8	点滴静注	30分間		
シスプラチン	70 mg/m ²	D1	点滴静注	4時間		

【術後補助 体重30kg以上】デュルバルマブ		主な使用目的			術後補助	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ	1500 mg/body	D1	点滴静注	1時間	28日間	術後8コースまで