

その他（泌尿器科）

BEP〈精巣腫瘍・胚細胞腫瘍〉

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
イトボシド	100 mg/m ²	D1-5	点滴静注	120分間	21日間	
シスプラチン	20 mg/m ²	D1-5	点滴静注	120分間		
プレオマイシン	30 mg/body	D2,9,16	点滴静注	30分間		

EP〈精巣腫瘍・胚細胞腫瘍〉

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
イトボシド	100 mg/m ²	D1-5	点滴静注	120分間	21日間	
シスプラチン	20 mg/m ²	D1-5	点滴静注	120分間		

GEMOX（CDDP抵抗性）〈胚細胞腫瘍〉

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1,8	点滴静注	30分間	21日間	
オキサリプラチン	130 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		

CDDP/VP-16〈神経内分泌腫瘍〉

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
イトボシド	100 mg/m ²	D1,2,3	点滴静注	120分間	21日間	
シスプラチン	80 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		