

腎細胞がん

アベルマブ+アキシチニブ

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アベルマブ	10 mg/kg	D1	点滴静注	60分間	14日間	
アキシチニブ	10 mg/body	連日	経口	分2		

テムシロリムス

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
テムシロリムス	25 mg/body	D1	点滴静注	30分間	7日間	

ニボルマブ

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	240 mg/m ²	D1	点滴静注	30分間	14日間	

【術後補助】ペムブロリズマブ q3w

主な使用目的

術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	投与期間は最大1年間

【術後補助】ペムブロリズマブ q6w

主な使用目的

術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	400 mg/body	D1	点滴静注	30分間	42日間	投与期間は最大1年間

ペムブロリズマブ+アキシチニブ

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	
アキシチニブ	10 mg/body	連日	経口	分2		

ペムブロリズマブ+レンパチニブ

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	
レンパチニブ	20 mg/body	連日	経口	分1		

腎細胞がん

ニボルマブ（q3w） + イピリムマブ

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	240 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	併用療法は4コースまで 5コース以降はニボルマブ単独療法
イピリムマブ	1 mg/kg	D1	点滴静注	30分間		

ニボルマブ（q2w） + カボザンチニブ

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	240 mg/body	D1	点滴静注	30分間	14日間	
カボザンチニブ	40 mg/body	連日	経口	分1		

ニボルマブ（q4w） + カボザンチニブ

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	480 mg/body	D1	点滴静注	30分間	28日間	
カボザンチニブ	40 mg/body	連日	経口	分1		