

膵臓がん

術後補助

GEM

主な使用目的 術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	30分間	28日間	

進行再発

FOLFIRINOX

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
オキサリプラチン	85 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間	14日間	CVポート レボホリナート開始30分後に イリノテカン開始 携帯型インフューザーポンプ使用
レボホリナート	200 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		
イリノテカン	180 mg/m ²	D1	点滴静注	90分間		
フルオロウラシル	400 mg/m ²	D1	点滴静注	全開投与		
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	D1	点滴静注	46時間		

mFOLFIRINOX

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
オキサリプラチン	85 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間	14日間	CVポート レボホリナート開始30分後に イリノテカン開始 携帯型インフューザーポンプ使用
レボホリナート	200 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		
イリノテカン	150 mg/m ²	D1	点滴静注	90分間		
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	D1	点滴静注	46時間		

GEM

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	30分間	28日間	

nab-PTX/GEM

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アルブミン懸濁型 パクリタキセル	125 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	30分間	28日間	
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	30分間		

膵臓がん

S1/GEM

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1,8	点滴静注	30分間	21日間	
S1	※添付文書参照	D1-14	経口	分2		

5FU/LV+nal-IRI

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
イリノテカン リボソーム製剤	70 mg/m ²	D1	点滴静注	90分間	14日間	CVポート 携帯型インフューザーポンプ使用 UGT1A1 *6または*28のホモ接合体及び*6と*28のヘテロ接合体を有する場合は50mg/m ² で開始
レボホリナート	200 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	D1	点滴静注	46時間		